

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная болезнь домашних свиней всех пород и возрастов и диких кабанов.

АЧС распространяется очень быстро и приносит большой экономический ущерб.

Вспышки африканской чумы свиней уже зарегистрированы в 42 регионах России, а действующие очаги в 16 регионах. Совсем недавно случай АЧС был зарегистрирован в соседнем регионе – Нижегородской области, до границ с Кировской областью по прямой 250 – 300 километров. Поэтому сейчас идет работа по предупреждению возникновения африканской чумы свиней как среди диких кабанов так и среди домашних свиней. Среди владельцев личных подсобных хозяйств не должно бытовать мнение о том, что опасность АЧС надуманная. По статистике, в 50 % случаев возникновения АЧС причиной стало использование пищевых отходов в корм домашним свиньям.

Возбудитель АЧС – очень устойчивый вирус в кормах, воде и внешней среде, сохраняется месяцами, замораживание на него не действуют, только нагревание до высоких температур убивает его.

Источник возбудителя – больные животные и вирусоносители.

Факторы передачи – инфицированные объекты (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и др.). Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней.

Механические переносчики - человек, домашние животные, дикие кабаны, грызуны, некоторые виды клещей, мухи, вши.

Клинические признаки – свиньи больше лежат, вяло передвигаются. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. Кожа в области ушей, глаз, груди, живота, конечностей, половых органов багрово – синего цвета с множественными кровоизлияниями. Иногда замечают расстройство пищеварения: запор или понос с примесью крови, гнойные выделения из глаз, отечное воспаление в области глотки, наблюдается истощение.

Специфического лечения и профилактики данного заболевания нет.

18 июля 2016 года вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации». Новые ветеринарные правила содержания свиней в равной степени применимы как в сельхозпредприятиях, в том числе крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

В целях предупреждения заноса АЧС необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. При наличии или приобретении свиней регистрировать их в государственном учреждении ветеринарии – получить регистрационный номер в форме бирки.
2. Предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы по их требованию свиней для осмотра, немедленно извещать ветеринарных специалистов о всех случаях падежа или массового заболевания свиней, а также об их необычном поведении.
3. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила перевозки и убоя свиней, переработки, хранения и реализации продуктов животного происхождения.
4. Завозимые или вывозимые свиньи подлежат обособленному содержанию от других животных и птицы в течении 30 дней. В этот период проводятся ветспециалистами необходимые мероприятия по карантинированию животных (клинический осмотр, исследования на бруцеллез, туберкулез, вакцинации против бешенства, против классической чумы свиней).
5. Пищевые отходы, используемые в корм свиньям должны подвергаться проварке в течении 30 минут с момента закипания.
6. Регулярно проводить дератизацию (раскладывать отравленную приманку для грызунов), обработку свиней против вшей, если таковые имеются.
7. Убой животных проводить на убойных пунктах.

Так же информацию можно получить по телефону Лебяжской УВЛ 2-04-50

Ветврач – эпизоотолог Лебяжской УВЛ Сахарных Р.Н.