

## **ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ»**

**Кировская область является неблагополучной по сибирской язве.** Последний случай заболевания сибирской язвой у животных был зарегистрирован в 1995 году в Слободском районе (животные не были вакцинированы против сибирской язвы).

**Сибирская язва** – особо опасная, общая для человека и животных болезнь, восприимчивые животные – млекопитающие. Характерными признаками болезни являются повышение температуры, мышечная дрожь, учащение пульса и дыхания, беспокойство, угнетенное состояние, отказ от корма, поражение кожи, кишечника, лёгких, лимфатических узлов и высокая смертность.

**Возбудитель** – спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде в споровой форме до 50 и более лет.

**Источник возбудителя** – больное животное, экскременты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), трупы восприимчивых животных, продукты животного происхождения и продукты их переработки, а также зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды.

Учитывая то, что сибирская язва является природно-очаговой болезнью, резервуаром возбудителя которой служит почва и другие объекты окружающей среды, **причинами вспышек болезни среди продуктивных животных могут являться:**

- выпас животных, использование грунта и посев кормовых культур на территории бывших сибиреязвенных скотомогильников;
- не предоставление животных для проведения профилактической вакцинации против сибирской язвы;
- несанкционированное перемещение и неправомерная реализация продукции животноводства и живых сельскохозяйственных животных.

**Основной путь заражения** у животных через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания. Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, при употреблении мяса больных животных в пищу. В зависимости от путей заражения у человека развивается кожная, кишечная, легочная формы сибирской язвы.

## **Меры профилактики для владельцев восприимчивых животных:**

1. Предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы животных для осмотра, идентификации и учета.
2. Выполнять требования специалистов государственной ветеринарной службы о проведении в личном подсобном хозяйстве противоэпизоотических мероприятий, в том числе предоставлять животных для проведения иммунизации против сибирской язвы в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности.
3. Не допускать содержание и выпас восприимчивых животных на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников.
4. Извещать в течение 24 часов специалистов государственной ветеринарной службы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание
5. Принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных в том же помещении (месте), в котором они находились.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий вытекает кровянистая жидкость.

Вскрытие трупов животных при подозрении на заболевание сибирской язвой запрещено!

6. Обращаться в государственные учреждения ветеринарии с целью проведения предубойного осмотра животных и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей.

**Управление ветеринарии Кировской области «горячая линия» 8-800-222-43-01**

Телефоны и адреса кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии находятся на сайте управления ветеринарии

Кировской области [www.vetuprkirov.ru](http://www.vetuprkirov.ru)